

En bref:

- ✓ Consultez votre dentiste avant le début du traitement par XGEVA®.
- ✓ Une bonne hygiène buccodentaire est très importante pendant le traitement par XGEVA®.
- ✓ Prenez chaque jour 500 mg de calcium et 400 UI de vitamine D.
- ✓ Si vous ressentez des douleurs, signalez-les immédiatement à votre médecin traitant.

Dites à votre dentiste que vous prenez XGEVA®

Médecin/infirmière

Hôpital/cabinet

Numéro de téléphone en cas de questions/d'urgence

—
AMGEN Switzerland AG
Suurstoffi 22
CH-6343 Rotkreuz

—
© 2021 AMGEN.
Rotkreuz, Schweiz.
Tous droits réservés.

CH-XGT-1120-00002

En bref: À quoi faut-il veiller lors du traitement par XGEVA® ?



Chère patiente, cher patient,
Le présent livret d'information a pour but de vous
guider pendant votre traitement par XGEVA®.

Hygiène buccodentaire



Une ostéonécrose de la mâchoire peut survenir, dans de très rares cas, au cours du traitement par XGEVA®. Parmi les facteurs de risque figurent notamment les caries, les inflammations de la gencive, le manque d'hygiène buccodentaire ou encore le tabagisme.

Conseils pour réduire le risque d'ostéonécrose:

- Un nettoyage dentaire professionnel tous les 6 mois est le meilleur moyen pour se protéger des inflammations.
- Brossez-vous les dents plusieurs fois par jour. N'employez pas de brosses à dents trop dures pour éviter des lésions sur la muqueuse buccale, particulièrement sensible. Nettoyez chaque jour en douceur les espaces interdentaires avec du fil dentaire ou des brossettes.

Important: Si vous portez des prothèses dentaires, celles-ci doivent être bien ajustées, sans former de points de pression sur la muqueuse. Faites vérifier régulièrement l'ajustement par votre dentiste.

Prenez chaque jour au moins 500 mg de calcium et 400 UI de vitamine D



XGEVA® protège les os d'une résorption excessive, mais l'organisme a besoin de ce fait de plus de calcium. Or, un taux de calcium très bas peut avoir des conséquences potentiellement mortelles. C'est pourquoi il est recommandé de prendre tous les jours du calcium et de la vitamine D, selon la prescription de votre médecin.

i Définitions

Ostéonécrose de la mâchoire

Maladie de l'os de la mâchoire, entraînant une diminution de l'irrigation sanguine et une dégradation de l'os. Les causes de l'ostéonécrose de la mâchoire sont encore mal connues.

Intervention invasive

En médecine, on appelle «intervention invasive» une méthode de diagnostic ou de traitement qui nécessite d'accéder à l'intérieur du corps.

Veuillez contacter immédiatement
votre médecin traitant dans les
cas suivants:



- En cas d'inflammation, de gonflement ou de douleur dans la bouche ou les dents, d'engourdissement ou de sensation de pression diffuse dans la mâchoire.
- Si une intervention dentaire invasive est nécessaire au cours du traitement par XGEVA®.
- En cas d'engourdissement ou de picotements dans les doigts/les orteils ou autour de la bouche, ou de crampes musculaires.
- En cas de réactions cutanées (p. ex. zone rouge, enflée, chaude et douloureuse).
- En cas de réactions allergiques telles que difficultés respiratoires, gonflements au niveau du visage, de la langue, des lèvres ou d'autres parties du corps.
- En cas d'effets secondaires comme: sueurs excessives, essoufflement, diarrhées.